(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第5765687号
(P5765687)

(45) 発行日 平成27年8月19日 (2015. 8. 19)

(24) 登録日 平成27年6月26日 (2015. 6. 26)

(51) Int. Cl.		F 1	
A 6 1 K 31/404	(2006. 01)	A 6 1 K	31/404
A 6 1 P 35/00	(2006. 01)	A 6 1 P	35/00
A 6 1 P 43/00	(2006. 01)	A 6 1 P	43/00
A 6 1 K 36/02	(2006. 01)	A 6 1 K	35/80

請求項の数 2 (全 10 頁)

(21) 出願番号	特願2012-167744 (P2012-167744)	(73) 特許権者	593206964 マイクロアルジェコーポレーション株式会社 岐阜県岐阜市曙町4-15
(22) 出願日	平成24年7月27日 (2012. 7. 27)	(73) 特許権者	304019399 国立大学法人岐阜大学 岐阜県岐阜市柳戸1番1
(65) 公開番号	特開2014-24813 (P2014-24813A)	(73) 特許権者	000125347 学校法人近畿大学 大阪府東大阪市小若江3丁目4番1号
(43) 公開日	平成26年2月6日 (2014. 2. 6)	(74) 代理人	100068755 弁理士 恩田 博宣
審査請求日	平成26年3月26日 (2014. 3. 26)	(74) 代理人	100105957 弁理士 恩田 誠

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 オートファジー性細胞死誘導剤

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

還元型スキトネミンを有効成分として含有するオートファジー性細胞死誘導剤（ただし、還元型スキトネミンをイシクラゲ抽出物として含有し、かつ抗ウイルス剤又は飲食品として適用される場合を除く。）。

【請求項2】

前記還元型スキトネミンはイシクラゲ由来であることを特徴とする請求項1に記載のオートファジー性細胞死誘導剤。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、還元型スキトネミンを含有するオートファジー性細胞死誘導剤に関する。

【背景技術】

【0002】

オートファジーは、細胞内におけるタンパク質の分解機構の一つであって、酵母からヒトにいたるまでの真核生物に見られる機構である。オートファジーが誘導されると、オートファゴソームと呼ばれる膜胞が形成される。次いで、オートファゴソームがリソソームと融合することにより、オートファゴソーム内に取り込まれたタンパク質が分解される。

【0003】

オートファジーは、一般的には細胞が飢餓状態に陥ることによって誘導されるが、発生

、分化等の生理機能や、細胞内に侵入したウイルスの排除等の感染防御機能にも関与することが明らかになってきている。そのため、オートファジーの制御は、癌治療やウイルス感染防御の分野に応用できる可能性があるとして、近年、注目されている。例えば、特許文献1には、特定のアミノ酸配列を有するペプチドに、オートファジー性細胞死を誘導する効果があることが開示されている。なお、オートファジー性細胞死とは、プログラム細胞死の1タイプ(タイプ2細胞死)であって、オートファジーを伴う細胞死である。

【0004】

一方、スキトネミン(Scytonemin)は、特定のシアノバクテリアに含有されている物質である。近年、スキトネミンに細胞の増殖を抑制する作用があることが報告されている(非特許文献1参照)。

10

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【特許文献1】国際公開2009/119662号パンフレット

【非特許文献】

【0006】

【非特許文献1】Stevenson S. C., Capper A. E., Roshak K. A., Marquez B., Eichman C., Jackson R. J., Mattern M., Gerwick H. W., Jacobs S. R., Marshall A. L. (2002). The Identification and Characterization of the Marine Natural Product Scytonemin as a Novel Antiproliferative Pharmacophore. J. Pharmacol. Exp. Ther., 303, 858-866.

20

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

本発明者らは、鋭意研究の結果、イシクラゲから単離した還元型スキトネミンについて、細胞の増殖抑制作用を有するとともに、その増殖抑制作用がスキトネミンよりも大きいことを見出した。また、還元型スキトネミンの増殖抑制作用がオートファジー性細胞死の誘導によるものであることを見出した。

【0008】

この発明は、上記の知見に基づいてなされたものであり、本発明の目的は、オートファジー性細胞死を誘導するオートファジー性細胞死誘導剤を提供することにある。

30

【課題を解決するための手段】

【0009】

上記の目的を達成するために請求項1に記載のオートファジー性細胞死誘導剤は、還元型スキトネミンを有効成分として含有する。ただし、還元型スキトネミンをイシクラゲ抽出物として含有し、かつ抗ウイルス剤又は飲食品として適用される場合を除く。

請求項2に記載のオートファジー性細胞死誘導剤は、請求項1に記載の発明において、前記還元型スキトネミンはイシクラゲ由来である。

【発明の効果】

【0010】

本発明のオートファジー性細胞死誘導剤によれば、オートファジー性細胞死を誘導することができる。

40

【図面の簡単な説明】

【0011】

【図1】還元型スキトネミンの単離工程の説明図。

【図2】還元型スキトネミン及びスキトネミンによる細胞増殖抑制効果を示すグラフ。

【図3】還元型スキトネミン処理時におけるLC3のウエスタンブロット解析結果。

【図4】還元型スキトネミン処理時におけるAktのウエスタンブロット解析結果。

【発明を実施するための形態】

【0012】

50

以下、本発明を具体化した実施形態のオートファジー性細胞死誘導剤を詳細に説明する。

本実施形態のオートファジー性細胞死誘導剤に有効成分として含有される還元型スキトネミンは、下記一般式(1)に示される構造を有する。

【0013】

【化1】

10

還元型スキトネミンは、高いオートファジー性細胞死誘導作用を有する。例えば、還元型スキトネミンを癌細胞に投与した場合には、癌細胞のオートファジー性細胞死が誘導されて、癌細胞の増殖が抑制される。

【0014】

また、還元型スキトネミンは、オートファジーの進行に関与する因子であるLC3レベルを増大させる作用を有する。LC3はオートファジーにおけるオートファゴソームの形成に関与するタンパク質であり、オートファゴソームへの移行に際して前駆型であるLC3-Iから活性型であるLC3-IIへと変換(修飾)される。還元型スキトネミンを投与することにより、LC3レベルが増大するとともに、LC3-IからLC3-IIへの変換が促進される。

20

【0015】

また、還元型スキトネミンは、オートファジーの抑制に関与する因子であるAktレベルを低下させる。オートファジーは、mTORが活性化しているときには誘導が抑制される。そして、mTORはPI3K/Aktを介したリン酸化カスケードにより活性化される。上記還元型スキトネミンを投与することにより、mTORの活性化に関与するAktレベルが低下する。

30

【0016】

よって、還元型スキトネミンを含有するオートファジー性細胞死誘導剤は、細胞のオートファジー性細胞死を誘導することができる。オートファジーは、発生、分化等の生理機能や、細胞質内に侵入したウイルスの排除等の感染防御機能にも関与する機構である。そのため、オートファジー性細胞死誘導剤は、癌治療(例えば、細胞増殖抑制剤)やウイルス感染防御(抗ウイルス剤)の分野への適用が期待できる。また、オートファジー性細胞死誘導剤は、PI3K/Akt/mTOR経路の阻害剤としての適用も期待できる。

【0017】

オートファジー性細胞死誘導剤は、例えば健康食品や食品等の飲食品等の添加剤、医薬品、及び医薬部外品として有用である。オートファジー性細胞死誘導剤は液状であってもよいし、固体状であってもよい。それらの剤形としては、特に限定されないが、例えば散剤、粉剤、顆粒剤、錠剤、カプセル剤、丸剤、液剤等が挙げられる。また、本発明の目的を損なわない範囲において、賦形剤、基剤、乳化剤、安定剤、溶剤、香料、甘味料等の添加剤を配合してもよい。

40

【0018】

また、オートファジー性細胞死誘導剤に含有される還元型スキトネミンとしては、例えば天然素材由来の精製品、生化学品、及び化学合成品を適用することができる。天然素材からの精製品を適用する場合、天然素材原料としては、例えば、シアノバクテリア(藍色細菌)、ネンジュモ科ネンジュモ属の陸生藍藻の一種であるイシクラゲ(Nostoc commune)を挙げることができる。そして、還元型スキトネミンは、イシクラゲを原料として抽出

50

工程及び単離工程を行うことにより得ることができる。以下、イシクラゲから還元型スキトネミンを得る方法について記載する。

【0019】

原料となるイシクラゲは、天然に自生する藻体であってもよいし、人工的に培養した藻体であってもよい。なお、安定供給が可能である点や品質保持が容易である点から、人工的に培養した藻体を用いることが工業的に好適である。また、原料としてのイシクラゲは採取したままの状態、採取後に破碎処理した状態、採取後に乾燥処理した状態、並びに採取後に破碎処理及び乾燥処理した状態のいずれの状態であってもよい。

【0020】

抽出工程は、イシクラゲから還元型スキトネミンを含む抽出物を抽出する工程である。抽出工程に用いる抽出溶媒としては、水、親水性有機溶媒、又は水と親水性有機溶媒との混合溶媒を用いることができる。親水性有機溶媒としては、例えば、メタノールやエタノール等の低級アルコール類、アセトン、及び酢酸エチルが挙げられる。抽出方法としては、公知の抽出方法、例えば冷水抽出、温水抽出、熱水抽出、及び蒸気抽出のいずれの方法を用いてもよい。

10

【0021】

抽出操作としては、抽出溶媒中にイシクラゲを所定時間浸漬させる。抽出操作においては、抽出効率を高めるべく、必要に応じて攪拌処理、加圧処理、及び超音波処理等の処理をさらに行ってもよい。抽出操作後、例えばろ過や遠心分離等の公知の分離法を用いて固液分離操作を行うことにより、抽出液と原料の残渣とを分離する。このとき、必要に応じて得られた抽出液（抽出物）の濃縮を行う。

20

【0022】

単離工程は、抽出工程にて得られた抽出物中に含まれる還元型スキトネミンを単離・精製する工程である。還元型スキトネミンは、上記抽出物を1又は2以上のクロマトグラフィを用いて精製することにより単離される。クロマトグラフィとしては、公知のクロマトグラフィ、例えば液体クロマトグラフィ、超臨界流体クロマトグラフィ、及び薄層クロマトグラフィを用いることができる。液体クロマトグラフィとしては、例えばカラムクロマトグラフィを用いることができ、より具体的には高速液体クロマトグラフィ（HPLC）及びオープンカラムクロマトグラフィを挙げることができる。クロマトグラフィ担体としては、例えばイオン交換クロマトグラフィ、分配クロマトグラフィ（順相・逆相クロマトグラフィ）、吸着クロマトグラフィ、及び分子排斥クロマトグラフィが挙げられる。分配クロマトグラフィとして、より具体的にはシリカゲル担体やODS担体を用いることが分離効率の観点から好ましい。

30

【0023】

上記各種クロマトグラフィを適宜組み合わせ、公知の使用方法で上記還元型スキトネミンを単離・精製することができる。上記各種クロマトグラフィの使用方法としては、公知の方法を適宜採用することができる。上記還元型スキトネミンの同定は、構造決定により、又は精製品を指標とすることにより行うことができる。

【0024】

次に、本実施形態における効果について以下に記載する。

40

(1) オートファジー性細胞死誘導剤は、還元型スキトネミンを有効成分として含有する。上記構成によれば、オートファジー性細胞死を誘導することができる。

【0025】

(2) 好ましくは、還元型スキトネミンはイシクラゲ由来である。上記構成によれば、イシクラゲに含まれる天然成分であることから、より副作用が少なく、生体に対してより安全に適用することができる。

【0026】

なお、本実施形態は、次のように変更して具体化することも可能である。

・ オートファジー性細胞死誘導剤は、還元型スキトネミンを単離・精製した状態で含有する構成に限らず、天然物の溶媒抽出物の状態で含有する構成であってもよい。例えば

50

、イシクラゲの溶媒抽出物を含有するオートファジー性細胞死誘導剤であってもよい。

【0027】

次に、上記実施形態及び別例から把握できる技術的思想について記載する。

(イ) 還元型スキトネミンをイシクラゲの溶媒抽出物として含有する前記オートファジー性細胞死誘導剤。

【0028】

(ロ) 還元型スキトネミンを有効成分として含有する細胞増殖抑制剤。

(ハ) 還元型スキトネミンの製造方法であって、水、親水性有機溶媒、又は水と親水性有機溶媒の混合溶媒を用いてイシクラゲから前記還元型スキトネミンを含む抽出物を抽出する抽出工程と、前記抽出物から前記還元型スキトネミンを単離する単離工程とを有する還元型スキトネミンの製造方法。

10

【実施例】

【0029】

次に、実施例を挙げて上記実施形態をさらに具体的に説明する。

<還元型スキトネミンの抽出・単離>

イシクラゲの乾燥粉体(400g)にエタノール(4L)を添加して、室温にて2時間攪拌するとともに30分間静置した後、上清を回収した。また、沈殿物に対して、エタノール(4L)を添加して、室温にて2時間攪拌するとともに30分間静置した後、上清を回収した。この沈殿物に対する再抽出操作を合計10回繰り返した。得られた全ての上清をろ紙によりろ過するとともに、そのろ液を減圧濃縮することにより、イシクラゲ抽出物(20g)を得た。

20

【0030】

イシクラゲ抽出物に対して、複数のクロマトグラフィによる分画を組み合わせて行うことにより還元型スキトネミンの単離を行った。図1を参照して、還元型スキトネミンの単離工程について説明する。

【0031】

イシクラゲ抽出物(18g)について、中性シリカゲルを用いた吸引液体クロマトグラフィを行うことにより8画分に分画し、TLCによる標品との比較に基づいて還元型スキトネミンが含有される画分(NC-5)を回収した。画分NC-5について、中性シリカゲルを用いた液体カラムクロマトグラフィを行うことにより5画分に分画し、TLCによる標品との比較に基づいて還元型スキトネミンが含有される画分(NC-5-4、NC-5-5)を回収した。

30

【0032】

画分NC-5-4について、更に中性シリカゲルを用いた液体カラムクロマトグラフィを行うことにより6画分に分画した。また、画分NC-5-5について、更に中性シリカゲルを用いた液体カラムクロマトグラフィを行うことにより4画分に分画した。そして、TLCによる標品との比較に基づいて還元型スキトネミンが含有される画分(NC-5-4-4、NC-5-5-4-5、NC-5-5-3)を回収するとともに、これらを一つに合わせて画分NC-5 Aとした。

【0033】

画分NC-5 Aについて、Sephadex LH-20を用いた液体カラムクロマトグラフィを行うことにより8画分に分画した。そして、TLCによる標品との比較に基づいて還元型スキトネミンが含有される画分(NC-5 A-7)を回収するとともに、その画分NC-5 A-7について、ODS担体を用いた液体カラムクロマトグラフィを行うことにより還元型スキトネミンを単離した。

40

【0034】

<細胞増殖抑制試験>

理化学研究所より入手したヒト白血病T細胞株Jurkat細胞を、10%牛胎児血清を含んだRPMI1640培地(和光純薬工業株式会社製)にて、95%空気-5%CO₂環境下で培養した。その後、Jurkat細胞を1×10⁵ cells/mLに調整し

50

、これを24ウェルマルチプレートに500 μ Lずつ播種した。2時間後、ジメチルスルフォキシド(DMSO)に溶解させた還元型スキトネミンを終濃度が1.0, 2.5, 5.0 μ Mとなるように各ウェルに添加して、培養を継続した。そして、還元型スキトネミンの添加後、24, 48, 72時間における細胞数を血球計算盤により計数した。また、比較例として、還元型スキトネミンに代えて下記一般式(2)：

【0035】
【化2】

10

に示すスキトネミンを添加して同様の試験を行った。それらの結果を図1のグラフに示す。

【0036】

なお、図1のグラフ中のコントロール(control)は被検サンプルと同量のDMSOにより処理した細胞を示す。また、同グラフ中の各プロットは平均値 $\pm$ 標準誤差(n=6)を示している。

20

【0037】

図2に示すように、還元型スキトネミンを投与した場合には、還元型スキトネミンの濃度依存的に細胞の増殖が抑制されている。また、還元型スキトネミンが有する細胞増殖抑制作用は、スキトネミンが有する細胞増殖抑制作用と比較して大きいものである。

【0038】

<LC3・Aktのウエスタンブロット解析>

Jurkat細胞を 1×10^5 cells/mLに調整し、6ウェルマルチプレートに3mLずつ播種した。播種後、還元型スキトネミンを終濃度が5.0 μ Mとなるように添加し、各ウェルの培養時間(処理時間)を異ならせつつ培養を行った。培養後、各細胞を遠心分離機(3,000rpm、10分、4)にてそれぞれ回収した。回収した細胞をPBS(-)にて洗浄した後、2%Protease inhibitor、2%Phosphatase inhibitor含有RIPA Buffer(25mM Tris-HCl(pH7.6), 150mM NaCl, 1%NP-40, 1%sodium deoxycholate, 0.1%SDS)を用いて細胞を溶解するとともに、超音波碎機を用いて細胞を破碎した。細胞破碎液に対して遠心分離処理(13,000rpm、5分間、4)を行い、上清を回収した。得られた上清のタンパク質濃度を所定濃度に調整した後、10%メルカプトエタノール含有サンプルバッファーを加えて98 $^{\circ}$ Cで5分間加熱し、これをサンプル溶液とした。

30

【0039】

各サンプル溶液中に含まれるタンパク質を10~15%SDS-PAGEにて分離するとともに、これをPVDE(Polyvinylidene difluoride)膜に転写した。PVDE膜を0.1%Tween20含有トリス緩衝化生理食塩水により溶解した5%脱脂粉乳溶液に浸して1時間のブロックングを行った後、LC3又はAktの一次抗体を加え、4 $^{\circ}$ Cにて一晩振とうした。その後、洗浄処理を行うとともに二次抗体を加え、1時間振とうした。PVDE膜上の抗原-抗体複合体を、ECL Plusキット(GE Healthcare社製)で5分間処理することにより化学発光させるとともに、その化学発光を化学光検出装置(Davinch-Chemi、和光純薬株式会社製)を用いて検出した。その結果を図3及び4に示す。

40

【0040】

50

図3に示すように、還元型スキトネミンの投与後、特に6～12時間後において、オートファジーの進行に関与する因子であるLC3レベルが増大するとともに、LC3-IからLC3-IIへの修飾が促進されている。また、図4に示すように、還元型スキトネミンの投与後、オートファジーの抑制に関与する因子であるAktレベル、具体的には、Akt及びその活性型であるリン酸化Aktのレベルが共に低下している。これらの結果から、還元型スキトネミンは、オートファジー性細胞死を誘導する作用を有し、その作用に基づいて細胞の増殖を抑制しているものと考えられる。

【0041】

なお、詳細な記載は省略するが、各種Caspase inhibitorの存在下において、上記と同様にして還元型スキトネミンによる細胞増殖抑制試験を行ったところ、Caspase inhibitorによる細胞増殖抑制の阻害作用は確認できなかった。また、還元型スキトネミン処理時におけるDNAの状態を観察したところ、DNAの断片化は確認できなかった。これらの結果から、還元型スキトネミンが有する細胞増殖抑制作用は、アポトーシスに起因するものではないことが示唆される。

【 図 1 】

フロントページの続き

(72)発明者 纈纈 守

岐阜県岐阜市柳戸1番1 国立大学法人岐阜大学 内

(72)発明者 伊藤 智広

奈良県奈良市中町3327-204 学校法人近畿大学 農学部 内

(72)発明者 竹中 裕行

岐阜県岐阜市曙町4-15 MAC総合研究所 内

審査官 石井 裕美子

(56)参考文献 特開2009-203168(JP,A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

A61K 31/404

A61K 36/02

A61P 35/00

A61P 43/00

CAPLUS/REGISTRY/MEDLINE/EMBASE/BIOSIS(STN)

JSTPLUS/JMEDPLUS/JST7580(JDreamIII)